

 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ	İLAÇ- BESİN ETKİLEŞİM LİSTESİ			 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ DIŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
Kodu SIY.LS.41	Yayın tarihi 20.10.2023	Revizyon No 0	Revizyon tarihi -	Sayfa No / Sayfa Sayısı 1 / 2

KULLANILAN İLAÇ	ETKİLEŞİMİ OLAN BESİNLER	ETKİLEŞİM SONUÇLARI
TETRASIKLINLER	SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ GİBİ KALSİYUMCA ZENGİN BESİNLERLE BİRLİKTE ALINMAMALI	KALSİYUM İLACIN EMİLİMİNİ AZALTABİLİR
PENİSİLİN	ASİTLİ BESİNLER; MEYVE SULARI,KAFEİN,DOMATES	ASİTLİ BESİNLERDEN DOLAYI ARTAN MİDE ASİDİ İLACIN MİDEDE HARABİYETİNİ ARTIRIR.
SİPROFLOKSASİN	SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ GİBİ KALSİYUMCA ZENGİN BESİNLERLE BİRLİKTE ALINMAMALI	KALSİYUM İLACIN EMİLİMİNİ AZALTABİLİR.
	ANTİBİYOTİK KULLANIMA BOYUNCA ,ÇİNKO,MAGNEZYUM SUPLEMENTİKULLANIMINDAN UZAK DURULMALIDIR.	ŞELASYON REAKSİYONLARI
SEFUROKSİM AKSETİL	MİDENİN TOK OLMASI	EMİLİMİ ARTAR.
ERİTROMİSİN	Asitli besinler (turunçgiller, rafine edilmiş soslar - ketçap, mayonez, hardal- gazlı içecekler) kafein, domates, meyve suları	Birlikte kullanılmamalıdır.
THEOPHYLINE	KAFEİN İÇEREN ÇAY,KAHVE.KOLALI İÇECEKLER	SİNİRLİLİK
VERAPAMİL	GREYFURT SUYU(NARİNGİN VE KUERSETİN İÇERİR.)	PLAZMA KONSANTRASYONLARINI ARTIRIR.
DIGOXİN	BUĞDAY KEPEĞİ; YULAF EZMESİ	EMİLİM AZALMASI İLAÇ LİF TARAFINDAN ADSORBSİYON EDİLİR.
NİFEDİPİN	GREYFURT SUYU	Birlikte kullanılmamalıdır.
NİCARDİPİNE	GREYFURT SUYU	Birlikte kullanılmamalıdır.
FELODİPİNE	GREYFURT SUYU	Birlikte kullanılmamalıdır.
NİMODİPİNE	GREYFURT SUYU	Birlikte kullanılmamalıdır.
NİSOLDİPİNE	GREYFURT SUYU	Birlikte kullanılmamalıdır.
LİTHİUM	SALAMURA BESİNLER,SODYUM İÇEREN YİYECEKLER	İLACIN YARARINI AZALTIR.
DİAZEPAM,ALPRAZOLAM, KLORDİAZEPOKSİT, LORAZEPAM	GREYFURT SUYU,YAŞLI VE OBEZ HASTALARDA VÜCUTTAKİ YAĞLI DOKU ARTAR.İLACIN BİRİKME RİSKİ ARTAR.	İLAC UZUN SÜREDE ATILMASI İLE TOKSİSİTE ARTIŞI
DEMİR PREPARATLARI	BESİNLERLE BİRLİTE (SÜTVE SÜT ÜRÜNLERİ ,KEPEKLİ ÜRÜNLER YUMURTA LİFLİ BESİNLER ÇAY KAHVE ,KALSİYUM İLAVELERİ)	EMİLİM AZALIR.BÜYÜK BİR KISMI ABSORBE OLMAZ.
WARFARİN	SOĞAN-SARIMSAK,LAHANA,KOYU YEŞİL YAPRAKLAR	İLACIN FİBRİNOLİTİK ETKİSİ ARTAR. K VİT İÇERDİKLERİNDEN PROTROMBİNİ DÜŞÜRÜCÜ ETKİSİ AZALIR.
WARFARİN	E VİTAMİNİ	KANAMA RİSKİNİ AZALTIR
RANİTİDİN	VİTAMİN B 12	MİDE PH'İ YÜKSELİR.EMİLİM AZALIR.
MIDAZOLAM-TRIAZOLAM	GREYFURT SUYU	Birlikte kullanılmamalıdır.

 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ	İLAÇ- BESİN ETKİLEŞİM LİSTESİ			 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ DIŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
Kodu SİY.LS.41	Yayın tarihi 20.10.2023	Revizyon No 0	Revizyon tarihi -	Sayfa No / Sayfa Sayısı 2 / 2

LOVASTATİN	GREYFURT SUYU	Birlikte kullanılmamalıdır.
ATORVASTATİN-SIMVASTATİN	GREYFURT SUYU	Birlikte kullanılmamalıdır.
FENOBARBİTAL VE PHENİTOİN	D – K VİTAMİNİ VE FOLİK ASİT	METOBOLİZMA ARTIRIR
VALPROİK ASİT	Karnitin (kırmızı et)	Birlikte kullanılmamalıdır.
KAPTOPRİL, RAMİPRİL, ENALAPRİL, FİSİNOPRİL, LİSİNOPRİL, KİNAPRİL, BENAZEPRİL, SİLAPRİL, PERİNDOPRİL, TRANDOLAPRİL	Potasyumca zengin besinler (muz, kayısı, turuncgiller, patates)	Birlikte kullanılmamalıdır.
ALUMİNYUM İÇERENLER	Portakal suyu	Aynı anda kullanılmamalı, en az 2 saat ara verilerek kullanılmalıdır.
MOKLOBEMİD	Tiramine zengin besinler (krem peynir dışındaki tüm peynirler, karaciğer, salam gibi fermente soslar, fermente soya fasulyesi ürünleri, bazı balıklar, çikolata, kahve, bazı bira ve şaraplar)	Birlikte kullanılmamalıdır.
SULFASALAZİN	Folik asit (ekmek, mısır gevreği, yeşil yapraklı sebzeler, brokoli, ıspanak, bezelye, portakal, mercimek)	Birlikte kullanılmamalıdır.
ASETİLSALİSİLİK ASİT	C vitamini, Folik asit (ekmek, mısır gevreği, yeşil yapraklı sebzeler, brokoli, ıspanak, bezelye, portakal, mercimek), Demir (tüm kırmızı etler, kuru baklagiller, koyu yeşil sebzeler, domates, pekmez)	Etki azalması.
TRIFLUCAN	Süt, yoğurt, alkol	Etki azalması.
ETOPOSİT, MERKAPTOPURİN, BUSULFAN, ESTRAMUSTİN, KEPESİTABİN, FLUOROUROSİL, TEMOZOLAMİD, HİDROKSİKARBAMİD, İMATİNİB, TRETİNOİN, TALİDOMİT, TACROLİMUS	Greyfurt	Aynı anda kullanılmamalı, en az 2 saat ara verilerek kullanılmalıdır.
TERFENADİN	Greyfurt	Birlikte kullanılmamalıdır.
TRİAMTEREN, AMİLORİDE, SPİRONOLAKTON	Potasyumca zengin besinler (muz, kayısı, turuncgiller, patates)	Birlikte kullanılmamalıdır.
BİSAKODİL	Süt	Birlikte kullanılmamalıdır.

Hazırlayan	Kontrol Eden Kal. Yön. Sorumlusu	Onaylayan Dekan