

 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ		KİSMİ (YARIM) DOZ İLAÇ LİSTESİ						 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ F
KOD:	İY.LS.44	YAYIN TAR.	10/20/2023	REV.TAR.	-	REV. NO	0	SAYFA SIRA

SIRA NO	İLAÇ ADI	SAKLAMA KOŞULU VE SÜRESİ
1	ACTRAPID HM 100IU/ML FLK.	25 °c nin altında 6 hafta saklanır. Açıldıktan sonra buzdolabında koymay
2	ALCAINE 5 MG 15 ML OFT.SOL.	Açıldıktan sonra 1 ay saklanır.
3	AMBISOME 50 MG FLAKON	İlk açılınca 2-8 °c de ve oda ısısında 24 saat saklanır. Dekstroz ile seyrelt °c de 7 günde 25 °c de 48 saatte saklanır.
4	AMPISID IV 1 G FLAKON	SF ile dilüe edildiğinde 25 °c nin altında 8 saat, 4 °c de 48-72 saat saklan
5	AMIKASIN, MIKASIN AMP	25 °c nin altında 24 saat saklanır.
6	AMPİSİNA FLAKON	1 Saat içinde tüketilmelidir.
7	ARVELES AMP.	25 °c nin altında 24 saat saklanır.
8	AVELOX 400 MG 250 MLSOL.	25 °c nin altında 24 saat saklanır.
9	BACTRIM 400 MG AMP.	6 Saat saklanır.
10	BELOC 5 MG AMP.	İnfüzyon solüsyonu ile seyreltildiğinde 12 saat saklanır.
11	CANCİDAS FLAKON	Hazırlanmış konsantre ilaç 25 °c nin altında 1 saat saklanır. Seyreltilmiş nin altında 24 saat 2-8 °c de 48 saat saklanır.
12	CEALB ALBUMİN FLAKON %20 50ML	Koruyucu başlık açıldıktan sonra 3 saat içinde kullanılmalıdır.
13	CEZOL/CEFOZİN/EQİZOLİN İM/İV FLK.	25 °c nin altında 24 saat saklanır. 2-8 °c de 10 gün saklanır.
14	CERNEVİT İM/İV KULL. FLK.	2-8 °c de 24 saat, 25 °c nin altında 6 saat saklanır.
15	CEFAKS İM/İV 750 MG FLK.	Hemen tüketilmeli, saklanacaksa 2-8 °c de 48 saat
16	COLMYCİN İM/İV 150 MG FLK.	2-8 °c de 7 gün saaklanır.
17	DEPAKİN 400 MG/4ML ENJ.SOL.AMP.	25 °c nin altında 24 saat saklanır.
18	DORMİCUM / DEMİZOLAM AMPUL	25 °c nin altında 24 saat . 5 °c de 3 gün saklanır.
19	DEKSAMET 8 MG AMPUL	25 °c nin altında 24 saat saklanır.
20	DİLTİZEM 25 MG FLK.	Seyreltildikten sonra bekletilmez.
21	DOPAMİN FRES. AMPUL	İnfüzyon çöz. 24 saat stabildir.
22	UNACEFİN 1G FLK.	25 °c nin altında 3 gün 2-8 °c de 10 gün
23	GENTA 40 AMPUL	2-8 °c de 4 gün saklanır.
24	GENTA DAMLA	Açıldıktan sonra 15 gün saklanır.
25	EXOCİN DAMLA	Açıldıktan sonra 15 gün saklanır.

26	TAVANIC/VOLEFLOK FLAKON	Kutudan çıkarılınca 3 gün stabildir.
27	PANTPAS FLAKON	Çözelti hazırlandıktan sonra 12 saat içinde kullanılmalıdır.
28	HUMULIN R FLAKON	Kutusu içinde 2-8 °c de buzdolabında, açıldıktan sonra oda ısısında 25 °c altında 28 güne kadar saklanır.
29	INVANZ 1G FLAKON	6 saat içinde inf. Tamamlanmalıdır, 2-8 °c de 24 saat saklanır. Buzdolabı çıkınca 4 saat de kullanılmalıdır.
30	METHYPREDNİSOLONE 40MG AMP.	Sulandırıldıktan sonra bekletilmeden kullanılmalıdır.
31	KETALAR FLAKON	Çözelti hazırlandıktan sonra 24 saat içinde kullanılmalıdır.

1- İlaçları mümkün olduğunca kullanmadan hemen önce hazırlayınız.

2- Hazırladığınız ilacı hastaya hemen uygulamayacaksanız, aseptik koşullarda hazırladığınıza emin olduğunuz dilue edilmiş ilac, ve ışık koruması altında, prospektüsünde yazılı olan saklama koşullarına uygun olarak saklayınız.

3- Aynı etken maddeyi ihtiva eden eşdeğer ilaçların saklanma koşulları birbirinden farklı olabilir. Tabloyu inceleyip prospektüsle desteklendikten sonra saklama koşulunuzu hazırlayınız.

4- Sakladığınız ilacı kullanmadan önce ; Gözünüzle renk ve çökelti yönünden kontrol ediniz.



ÜNİVERSİTESİ
FAKÜLTESİ

NO 1/1

İNİZ

İLİNCE 2-8

İR.

İLAC 25 °C

c nin
ndan

uygun ısı

!